

INNOBAP

Un réseau régional de plateformes d'échanges pour améliorer l'identification des besoins des agriculteurs et la diffusion de nouvelles variétés de bananier et plantain

CARBAP Cameroun, CENAREST Gabon, INRAB Bénin, IRAG Guinée

Evaluation 6 MAP

Tori-Bosito et Zé (Bénin)

(février 2007 : photos JL et BA)

Coordination régionale :


Kodjo TOMEKPE et Achille BIKOÏ (CARBAP) et Jacques LANÇON (CIRAD)

Coordinations nationales :

Cyrille EFANDEN et Bertrand Ndemba (CARBAP), Mathieu Lama (IRAG) Bernardin LOKOSSOU (INRAB), Clotilde Ngnigone (CENAREST)









A Zé, une nécrose précoce de jeunes feuilles sur CRBP 755 (ci-dessus) estelle le signe d'attaques de fusariose ?

Les planteurs sont un peu déçus par la petite taille des premiers régimes de CRBP 755.



Les attaques de cercosporiose jaune ont été nombreuses sur la PCR.











Classement à Tori-Bosito

Variété	Pour	Contre
CRBP 755	Vigueur, précocité, rejetonnage, résistance cerco	Bunchy
Pelipita	Vigueur	Signes sécheresse, rejetonnage
Bâtard	Rejetonnage	Traces cerco
Big Ebanga		Aspect plus frêle, Sensible cerco
Local		Aspect plus frêle, Sensible cerco

16 producteurs (5 femmes) réunis sur la PCR, le 6 février 2007

Chopa, hôte de la PCR de Tori



Omer, hôte de la PCR de Zé

Classement à Zé

Variété	Pour	Contre
Pelipita	Vigueur, assez précoce, moins de feuilles sèches	Rejetonnage tardif
Big Ebanga	Résiste sécheresse, assez précoce	Aspect plus frêle, Sensible cerco
Bâtard	Rejetonnage, vigueur	Assez feuilles sèches
Ekon-Zok	Feuilles vertes	Un peu en retard sur rejets Beaucoup feuilles sèches
Local	Nombreux rejets	Beaucoup feuilles sèches
CRBP 755	Vigueur, précoce, feuilles vertes	Régime et doigts de petite taille

8 producteurs (3 femmes) réunis sur la PCR, le 7 février 2007



